

Maladie d'Aujeszky (Pseudo Rage)



Maladie	Bactérienne <input type="checkbox"/>	Virale <input checked="" type="checkbox"/>	Parasitaire <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>
Principales espèces animales touchées	Suidés : Porcs et sangliers (réservoirs), carnivores et plus rarement ruminants (accidentel)			
Zoonose (transmissible à l'homme)	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Maladie réglementée (déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Résistance de l'agent contaminant	Dans le milieu naturel :	Plusieurs semaines selon la température (de 4 à 25°) et le pH (6 à 8)		
	Au froid :	Résiste à la congélation dans les viandes		
	Au chaud :	Disparaît à la cuisson		
	Aux agents chimiques :	Sensible aux désinfectants classiques		

DANS LA FAUNE SAUVAGE	
Maladie mortelle	Peut être mortelle chez les jeunes suidés. Jamais chez les adultes.
Symptômes	Chez les jeunes porcelets : signes nerveux d'encéphalite : fièvre, convulsions, tremblements, pédalages. On ne sait pas si les symptômes sont les mêmes chez les jeunes marcassins. Avortements possibles chez les truies. Chez les laies ? ?
Organes atteints	Chez les suidés : encéphale, poumons, organes génitaux.
Causes de la maladie	Virus de la famille des Herpesvirus Les sécrétions bucco-nasales, génitales, le lait, les cadavres et les abats (surtout les poumons) sont contaminants
Période(s) critique(s)	-
Voies de contamination	Contact direct : groin à groin (inhalation), par la saillie, par le lait Contact indirect : locaux, matériel, alimentation (eau grasse) contaminés (inhalation, ingestion)
Prévention	Réguler les populations, En cas de suspicion, éviter l'agrainage (favorise les rassemblements). Ne pas abandonner les viscères.

Risque de passage animaux sauvages ↔ domestiques	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Voies de contamination : Contact direct avec animal contaminé, indirect (ingestion, inhalation)
	Espèces sensibles : Porcs
	Prévention : Empêcher contact sangliers / porcs plein air (clôtures obligatoires) Ne pas donner d'eaux grasses
Risque de transmission aux chiens de chasse	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Dangerosité : Encéphalite rapidement mortelle. Démangeaisons avec automutilation.
	Prévention : Ne pas donner d'abats, désinfecter les blessures de chasse.

CHEZ L'HOMME